

Muscat bleu



Synonyme

In der Schweiz: Muscat Garnier 83/2.

Herkunft

Schweiz. Diese Rebsorte wurde in den 30er-Jahren vom Rebschulisten Garnier in Genf gezüchtet. Sie stammt aus einer interspezifischen Kreuzung zwischen Garnier 15/6 und Seyve-Villards 20-347.

Phänologie

Austrieb: mittel.

Reife: früh.

Bedeutung und Verbreitung

In der Schweiz (BLW, 2009)

Total: < 3 ha.

Weltweit

Diese Rebsorte wird hauptsächlich in der Schweiz angebaut.

Eigenschaften der Sorte

Wuchs: mittlerer bis schwacher Wuchs. Haltung halb aufrecht.

Ertrag: mittel, aber manchmal unregelmässig. Kann bei schlechten Wetterbedingungen während der Blüte anfällig auf Verrieselung und Kleinbeerigkeit sein.

Krankheiten, Schädlinge, Mangelerscheinungen und physiologische Störungen: kaum anfällig gegen Pilzkrankheiten.

Bevorzugte Anbauggebiete: aufgrund ihres eher schwachen Wuchses müssen die Böden genügend fruchtbar sein.

Oenologisches Potenzial

Most: leicht aromatisch, mit mittlerem bis hohem Zucker- und eher schwachem Säuregehalt.

Wein: diese Rebsorte wird hauptsächlich für die Produktion von Tafeltrauben angebaut. Ihre Trauben werden vor allem für ihre knackigen Beeren und ihr Muskataroma geschätzt. Werden die Trauben gekeltert liefert der Muscat bleu aromatische Weine von mittlerer Struktur.

Triebspitze

Öffnung: vollständig offen

Intensität der Antocyanfärbung: gering

Dichte der Wollbehaarung: gering



Ausgewachsenes Blatt

Form der Blattspreite: keilförmig bis fünfeckig

Anzahl der Lappen: 3

Farbe der Oberseite: hellgrün

Pigmentierung der Blattadern: bis zur 1. Adernverzweigung

Waffelung: mittel bis stark

Profil: Rand nach oben gebogen

Blasigkeit: mittel

Form der Zähne: beiderseits geradlinig


Öffnung der Stielbucht: offen

Form der Stielbuchtbasis: klammerförmig ({})

Besonderheiten der Stielbucht: keine

Dichte der Wollbehaarung (Unterseite): fehlend

Dichte der Borstenbehaarung der Hauptadern (Unterseite): fehlend



Unterseite

Junges Blatt

Farbe (Oberseite): bronziert, bis kupfer-rötlich

Dichte der Wollbehaarung (Unterseite): fehlend



Oberseite



Unterseite

Trieb

Farbe der Rückenseite: rot

Farbe der Bauchseite: grün und rot


Antocyanfärbung der Knospen: fehlend



Rückenseite



Bauchseite



Gelbe Beere:
Referenz
Chasselas



Traube

Länge: lang

Dichte: locker

Stiel: mittel bis lang

Form: kegelförmig

Anzahl der Flügel:

der Haupttraube: 3-4

Beere

Länge: mittel bis lang

Form: kurz elliptisch

Hautfarbe: blauschwarz

**Intensität der Fruchtfleisch-
farbe:** fehlend